



TITLE:

# 可換環上のTwisted Chevalley群の 正規部分群について (リー環,代数 群とその周辺)

AUTHOR(S):

鈴木, 和雄

---

CITATION:

鈴木, 和雄. 可換環上のTwisted Chevalley群の正規部分群について (リー環,代数群とその周辺). 数理解析研究所講究録 1980, 394: 201-206

ISSUE DATE:

1980-08

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/104983>

RIGHT:

## 可換環上の twisted Chevalley 群の 正規部分群について

熊本大 教養 鈴木和雄

$A$  を局所環とする。このとき W. Klingenberg [5] は  $SL_{n+1}(A)$   $Sp_{2n}(A)$  ( $n \geq 1$ ) の正規部分群は少数の場合を除いて合同部分群であることを示した。E. Abe [1] は、その一般化として Chevalley-Demazure group scheme  $G$  の  $A$  における葉の存在群  $G(\mathbb{Z}, A)$  の正規部分群の決定は特別の場合を除いて  $A$  の ideal とその  $\mathbb{Z}$ -submodule を決定することに帰着することを示した。更に E. Abe, K. Suzuki [3] はより一般の可換環  $A$  に対して  $G(\mathbb{Z}, A)$  の正規部分群の特徴づけについて論じている。

一方 K. Suzuki [4] は [1] の analogy として局所環  $A$  上の twisted Chevalley 群  $G_0(\mathbb{Z}, A)$  の正規部分群の特徴づけをなした。こゝではより一般の可換環上の twisted Chevalley 群の正規部分群の特徴づけについて [3] の analogy が可能であることを述べたい。

(1)

§1  $G_0(\Phi, A)$  のある部分群

$G$  を単連結又は適伴型の  $\Phi = A_n (n \geq 2)$ ,  $D_n (n \geq 4)$ ,  $E_6$  型の単純 Chevalley-Demazure group scheme とする。  $A$  は単位元をもち involutive な自己同型をもつ可換環とし,  $\sigma$  は  $\Phi$  の canonical な involutive な自己同型とする。  $\tau, \sigma$  に関して  $G$  に対応する  $\Phi_\sigma$  型の  $A$  上の twisted Chevalley 群を  $G_0(\Phi, A)$  とする。 以下定義, 記号等は  $\sigma$  の  $\sigma, E, A, b \in \mathbb{Z}$  を用いる。

$a \in A, r \in \Phi$  に対しそれぞれ  $\tau(a) = \bar{a}, \sigma(r) = \bar{r}$  とおき,  $A_0 = \{u \in A \mid u = \bar{u}\}$ ,  $\mathcal{O} = \{(a, b) \in A \times A \mid a\bar{a} = b + \bar{b}\}$  とおく,  $\mathcal{I} = (a, b)$ ,  $\gamma = (c, d) \in \mathcal{O}$  に対し,  $\mathcal{I} + \gamma = (a+c, b+d+\bar{a}c)$  とおく。  $\mathcal{O}$  は  $+$  について群を作る。

$A$  の  $\tau$ -不変な ideal を  $I$  とし,  $\mathcal{I}_0 \in \{a + \bar{a}, a\bar{a}u \mid a \in I, u \in A_0\}$  から生成された  $\mathbb{Z}$ -module とする。

(i)  $\Phi_\sigma = {}^2A_{2n+1} (n \geq 1), {}^2D_n (n \geq 4), {}^2E_6$  のとき,  $\mathcal{I}_0$  を次のような  $A_0$  の  $\mathbb{Z}$ -submodule とする。

(a)  $\mathcal{I} \cap A_0 \supset \mathcal{I}_0 \supset \mathcal{I}_0$

(b) 特に  $\Phi_\sigma = {}^2A_{2n+1}$  のとき, 任意の  $a$  に対し  $a\bar{a}\mathcal{I}_0 \subset \mathcal{I}_0$ 。

$\Phi_\sigma = {}^2E_6$  のとき  $\mathcal{I}_0$  は  $A_0$  の ideal とする。

(ii)  $\Phi_\sigma = {}^2A_{2n} (n \geq 1)$  のとき,  $\mathcal{O}_I^{(1)}, \mathcal{O}_I^{(2)}$  をそれぞれ  $\{(0, a - \bar{a}), (ac, a\bar{a}d) \mid a \in I, (c, d) \in \mathcal{O}\}, \{(t, u) \mid u \in I, t \in I \text{ for all } (t', u') \in \mathcal{O}\}$  から生成された  $\mathcal{O}$  の部分群とする。

(2)

$\mathcal{O}_I$  を次の様な  $\mathcal{O}$  の部分群とする。

$$(a) \quad \mathcal{O}_I^{(2)} > \mathcal{O}_I > \mathcal{O}^{(1)}$$

$$(b) \quad \text{任意の } a \in A, (c, d) \in \mathcal{O}_I \text{ に対し, } (ac, a\bar{a}d) \in \mathcal{O}_I$$

$\Phi_0$  の元  $S = \{r\}, \{r, \bar{r}\}, \{r, \bar{r}, r+\bar{r}\}$  に対応して  $I_S$  をそれぞれ  $I_0, I, \mathcal{O}_I$  とする。  $E(\Phi_0, I, I_S)$  を  $\{x_S(a) \mid a \in I_S, S \in \Phi_0\}$  から生成された, elementary な部分群  $E(\Phi_0, A)$  の正規部分群とし  $E^*(\Phi_0, I, I_S)$  を  $\{x \in G_0(\Phi, A) \mid [x, G_0(\Phi, A)] \subset E(\Phi_0, I, I_S)\}$  から生成された  $G_0(\Phi, A)$  の部分群とする。特に  $I_0 = A_0 \cap I$ ,  $\mathcal{O}_I^{(2)} = \mathcal{O}_I$  のときは  $E(\Phi_0, I, I_S) = E(\Phi_0, I)$ ,  $E^*(\Phi_0, I, I_S) = E^*(\Phi_0, I)$  とおく。

## §2 正規部分群.

次の条件を設ける。

(C 1) (i)  $\Phi_0 = {}^2A_{2n+1} (n \geq 1), {}^2D_n (n \geq 4), {}^2E_6$  のとき, 任意の  $\pi$ -不変な maximal ideal  $\pi_\lambda$  に対して自然な準同型写像  $A_0 \rightarrow (A/\pi_\lambda)_0$  は surjective である。

(ii)  $\Phi_0 = {}^2A_{2n} (n \geq 3)$  のとき 任意の  $\pi_\lambda$  において  $\hat{a}\bar{a} = \hat{b} + \bar{b}$  なる  $\hat{a}, \hat{b} \in A/\pi_\lambda$  に対して,  $a\bar{a} = b + \bar{b}$  なる  $\hat{a}, \hat{b}$  の代表元  $a, b$  がとれる。

(A)  $A$  が局所環のとき,  $G_0(\Phi, A)$  の正規部分群の特徴づけは K. Suzuki [4], G. Straker [6] に於て論じられているが

[3]を参照すれば半局所環の場合も同様なことが成立つて  
 かわかる。

定理1.  $A$  を半局所環とし,  $A$  の任意の  $\tau$ -不変な maximal  
 ideal  $\pi_\lambda$  に対し条件 (C1) をみたし,  $\Phi_0 = \overset{G \text{ 単連結}}{^2A_{2n+1}}, {}^2D_n, {}^2E_6$   
 において  $|A_0/\pi_{\lambda,0}| \geq 5$   $\pi_{\lambda,0} = A_0 \cap \pi_\lambda$  とする.  $\Phi_0 = {}^2A_3, {}^2D_n$   
 のとき  $2$  が  $A$  で invertible とし,  $\Phi_0 \neq {}^2A_2, \neq {}^2A_4$  とする. このと  
 き,  $G_\alpha(\Phi, A)$  の部分群  $N$  が  $E(\Phi_0, A)$  で正規化されるとする  
 とき, 次のような  $A$  の  $\tau$ -invariant な ideal  $I$  と  $I_S$  が一  
 意的に決まる

$$E^*(\Phi_0, I, I_S) \supset N) E(\Phi_0, I, I_S)$$

注. G. Strecker [6] は  ${}^2A_3, {}^2D_n$  のとき,  $2$  が invertible  
 なる条件をはずすため  $I, I_0$  を定義し直して成功している。

(B) さて, 以下  $A$  を単位元をもつ可換環とする。

$\{\pi_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$  を  $A$  の maximal ideal の集合.  $\mathcal{J}$  を maximal  
 ideal の中集の有限個の共通部分の集合族, すなわち

$$\mathcal{J} = \{ \mathcal{O}_\alpha = \bigcap_{i=1}^s \pi_{\mu_i}^{e_i} \mid \mu_i \in \Lambda, e_i, \dots, e_s: \text{自然数} \} \text{ とし, } \tilde{A} = \varprojlim_{\mathcal{O}_\alpha \in \mathcal{J}} A/\mathcal{O}_\alpha$$

とする.  $\mathcal{J}' = \{ \mathcal{O}_\beta = \bigcap_{i=1}^t \pi_{\nu_i}^{f_i} \mid \pi_{\nu_i}: A \text{ の } \tau\text{-不変な max. ideal, } f_1, \dots, f_t: \text{自然数} \}$  とすると,  $\mathcal{J}, \mathcal{J}'$  は  $A$  に同相な位相を  
 与える。

(4)

次の条件を設ける。

条件(CII)  $A$  の任意の ideal  $\mathcal{O}$  に対して

$$\mathcal{O} = \bigcap_{\mathcal{O}_\alpha \in \mathcal{J}} (\mathcal{O} + \mathcal{O}_\alpha)$$

Noether環や体の直積についてはこの条件は満たされる。また

$$\bigcap_{\mathcal{O}_\alpha \in \mathcal{J}} (\mathcal{O} + \mathcal{O}_\alpha) = \bigcap_{\mathcal{O}_\beta \in \mathcal{J}'} (\mathcal{O} + \mathcal{O}_\beta) = \mathcal{O} \quad \text{となる。}$$

さて  $2$  が  $A$  において invertible であるとき,  $E(\Phi_\alpha, I, I_s) = E(\Phi_\alpha, I)$ ,  $E^*(\Phi_\alpha, I, I_s) = E^*(\Phi_\alpha, I)$  となり, また条件(CI)

をみたす。任意の  $\mathcal{O}_\beta \in \mathcal{J}'$  に対して  $A/\mathcal{O}_\beta$  は半局所環であるから  $G_\alpha(\Phi, A/\mathcal{O}_\beta) = E(\Phi_\alpha, A/\mathcal{O}_\beta)$  となり, 自然な準同型写像  $G_\alpha(\Phi, A) \rightarrow G_\alpha(\Phi, A/\mathcal{O}_\beta)$  は surjective である。したがって

$$G_\alpha(\Phi, \hat{A}) = \varprojlim_{\mathcal{O}_\beta \in \mathcal{J}'} G_\alpha(\Phi, A/\mathcal{O}_\beta) = \varprojlim_{\mathcal{O}_\beta \in \mathcal{J}'} G_\alpha(\Phi, A) / G_\alpha(A, \mathcal{O}_\beta)$$

と、 $2$  "  $G_\alpha(A, \mathcal{O}_\beta) = G_\alpha(\Phi, A) \cap G(A, \mathcal{O}_\beta)$  とする。

$T_\alpha(A)$  を  $T(R)$  の  $\alpha$ -不変な元からなる群とする。  $E(\Phi_\alpha, A)$  と  $T_\alpha(A)$  とから生成される  $G_\alpha(\Phi, A)$  の部分群を  $G_\alpha^\circ(\Phi, A)$  とする。  
このとき、[3] と同じ方法によって次の定理が得られる。

定理2. 可換環  $A$  において  $2$  が invertible とし, 条件(CII) が満たされているとする。 $\Phi_\alpha = \overset{\text{GE単連結}}{^2A_{2n+1}} (n \geq 1), ^2D_n (n \geq 4)$   
 $^2E_6$  のとき  $|A_0/\mathfrak{m}_\lambda| \geq 5$ ,  $\mathfrak{m}_\lambda$ : 任意の max. ideal が" 或"  $n \geq 5$   
 $\Phi_\alpha \neq ^2A_2, \neq ^2A_4$  とする。  $E(\Phi_\alpha, A)$  の任意の元  $z$  を正規化され  
(5)

る  $G_0^*(\Phi, A)$  の部分群  $N$  に対し,  $A$  の  $\sigma$ -不変な ideal  $I$  が一意的に存在し.

$$G_0^*(\Phi, I) \supset N \supset E(\Phi_0, I)$$

となる, ここで  $G_0^*(\Phi, I)$  は  $\{x \in G_0^*(\Phi, A) \mid [x, G_0^*(\Phi, A)] \subset G_0^*(\Phi, I)\}$  から生成される  $G_0^*(\Phi, A)$  の部分群である。

### 文献

- [1] E. Abe: Chevalley groups over local rings. Tohoku Math. J., 21(1969) 474-494.
- [2] — : Coverings of twisted Chevalley groups over commutative rings. Sc. Rep. T. K. D. Sect. A, 13(1976) 194-218.
- [3] E. Abe, K. Suzuki: On normal subgroups of Chevalley groups over commutative rings. Tohoku Math. J., 28(1976) 185-198.
- [4] K. Suzuki: On normal subgroups of twisted Chevalley groups over local rings. Sc. Rep. T. K. D. Sect. A, 13(1976) 238-249.
- [5] W. Klingenberg: Linear Gruppen über lokalen Ringen. Amer. J. Math., 83(1961) 137-153.
- [6] G. Strecker: Unitäre Gruppen über beliebigen lokalen Ringen. J. Algebra. 57(1979) 258-270.